

Péče o chráněná území Zlínského kraje 2023 - 2027

Tento projekt je financován **Evropskou unií**.

Cílem projektu je opatření na podporu biodiverzity v chráněných územích a tvorby koncepčních dokumentů pro síť reprezentativních chráněných územích ve Zlínském kraji a zpracování podkladů pro zajištění jejich územní ochrany.

Termín realizace projektu: 01/2023 – 12/2027



Plán péče o přírodní památku Na Jančích

Na období

2026 – 2035



**Ing. Marián Horváth, Ph.D.
Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph.D.**

*Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství*

protokolem č.j. ze dne

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1
1.1 Základní identifikační údaje	1
1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	1
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	2
1.6 Kategorie IUCN	3
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	3
1.8 Cíl ochrany	5
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	6
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	6
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	6
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	7
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	10
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	10
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	12
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	12
2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky	12
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranných zásahů do území a závěry pro další postup	13
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	15
3. Plán zásahů a opatření	16
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	16
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	16
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	19
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	19
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	20
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	20
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	20
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	21
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	21
4. Závěrečné údaje	22
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	22
4.2 Použité podklady a zdroje informací	22
4.3 Seznam používaných zkratk	23
4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	23
5. Přílohy	25

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:	259
kategorie ochrany:	Přírodní památka
název území:	Na Jančích
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	Výnos
orgán, který předpis vydal:	Ministerstvo školství a kultury
číslo předpisu:	17.835/55
datum platnosti předpisu:	17. 2. 1956
datum účinnosti předpisu:	--

Výnos Ministerstva školství a kultury č. 17.835/55 ze dne 17. 2. 1956 o zřízení státní přírodní rezervace „Na Jančích“. Nyní je území vedeno jako PP - přírodní památka.

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:	Zlínský
okres:	Kroměříž
obec s rozšířenou působností:	Bystřice pod Hostýnem
obec s pověřeným obecním úřadem:	Chvalčov
obec:	Chvalčov
katastrální území:	Chvalčov (654892)

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území

Katastrální území: (654892) Chvalčov

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
1062/1		trvalý travní porost		84223	25206
Celkem					25206

Výměra parcel, které zasahují do ZCHÚ částí byla stanovena planimetrováním v GIS nástroji, přičemž výměra v dotčené ploše byla stanovena územním ziskem dle georeferenčního systému S-JTSK/Krovak East North – kód EPSG:5514.

Druh pozemku dle KN, způsob využití pozemku dle KN a výměra parcely celková podle KN byly získány z vektorové vrstvy definičních bodů parcel KN dostupné na <https://services.cuzk.cz/>.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	ZCHÚ plocha v ha	Vyhlášené OP plocha v ha	Způsob využití pozemku	ZCHÚ plocha v ha
lesní pozemky	-	-		
vodní plochy	-	-	zamokřená plocha	-
			rybník nebo nádrž	-
			vodní tok	-
trvalé travní porosty	2,5206	-		
orná půda	-	-		
ostatní zemědělské pozemky	-	-		
ostatní plochy	-	-	neplodná půda	-
			ostatní způsoby využití	-
zastavěné plochy a nádvoří	-	-		
plocha celkem	2,5206	-		

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):

překryv s jiným typem ochrany:

-
-
- Přírodní park Hostýnské vrchy (kód: 707)
- EECONET zóna zvýšené péče o krajinu (kód: 227)
- Územní působnost Karpatské úmluvy - Vnější Západní Karpaty IX
- Významný krajinný prvek Mokřad nad OÚ ve Chvalčově

mezinárodní statut ochrany:

-

Natura 2000

ptačí oblast:

evropsky významná lokalita:

- Hostýnské vrchy (kód: 2309)
- CZ0724429 Hostýnské vrchy (kód: 5589)

Území přírodní památky se nachází v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy.

Ptačí oblast byla vymezena nařízením vlády č.22/2005 Sb. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace druhů ptáků - strakapoud bělohřbetý (*Dendrocopos leucotos*) a lejsek malý (*Ficedula parva*) a jejich biotop.

1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Lokalita velmi vzácného snědku kulatoplodého.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

Posláním přírodní památky je ochrana populací a biotopu snědku kulatoplodého (*Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum*).

A. ekosystémy

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému	kód předmětu ochrany*
T1.9. Střídavě vlhké bezkolencové louky	9,54	Sečené louky. Vlhčí část území. Luční společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (biotop T1.9), místy s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1). V jižní a západní části ZCHÚ po okrajích na kontaktu s lesními společenstvy degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní a ostružiníku.	a

Pozn.: Přírodní biotopy a habitaty dle vrstvy Přírodní biotop aktualizace 2007 – 2021 a Habitat aktualizace 2007 – 2021 WMS AOPK ČR.

Ekosystémy klasifikovány dle Chytrý et al. 2010.

B. druhy

druh	stupeň ohrožení**	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace	kód předmětu ochrany*
vstavač osmahlý (<i>Orchis ustulata</i>)	CR	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z let 2013-2015- 5-10 ex. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.	a

snědek pyrenejský kulatoplodý (<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i>)	EN	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu: 10.7.1946-plný květ, Hynek Zavřel-1. zmínka, 15.4.2015, 300 listových růžic, většina listů již poškozena okusem, 16.6.2015, 201 nakvétajících rostlin, zčásti spasené 4.8.2015, 35 rostlin s částečně zralými semeníky, všechny ostatní rostliny zjištěné 16.6.2015 spasené, poškozování okusem. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.	a
vstavač mužský znamenáný (<i>Orchis mascula</i> ssp. <i>signifera</i>)	EN	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.	a
mečík střechovitý (<i>Gladiolus imbricatus</i>)	VU	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky, trpí okusem zvěře. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.	a*

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:

Grulich & Chobot (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. Cévnaté rostliny. Příroda 35, Praha, 178 s.

Kategorie ohrožení dle IUCN:

CR - kriticky ohrožený druh

EN - ohrožený druh

VU - zranitelný druh

Výskyt uvedených ZCHD byl aktualizován dle provedených průzkumů, jejichž zdroj je uveden v použité literatuře.

*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz i kap. 3.4)

Přílohy:

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

M4 - Mapa biotopů

1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

ekosystém	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
T1.9. Střídavě vlhké bezkolencové louky	Udržení, resp. zlepšení stavu biotopu, rozšíření jeho plochy a zároveň zachování příznivého stavu pro výskyt zvláště chráněných a ochránářsky významných druhů rostlin a živočichů.	- rozloha ekosystému v PP (cca 10%) - absence invazních a expanzivních druhů rostlin

B. druhy

druh	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
vstavač osmahlý (<i>Orchis ustulata</i>)	Zachování životaschopné populace v ZCHÚ	min. nižší desítky jedinců
snědek pyrenejský kulatoplodý (<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i>)	Zachování životaschopné populace v ZCHÚ	min. vyšší desítky jedinců
vstavač mužský znamenáný (<i>Orchis mascula</i> ssp. <i>signifera</i>)	Zachování životaschopné populace v ZCHÚ	min. nižší desítky jedinců
mečík střechovitý (<i>Gladiolus imbricatus</i>)	Zachování životaschopné populace v ZCHÚ	min. nižší desítky jedinců

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Lokalita se nachází 450 m severně od rekreační oblasti Na Valaškách, 3 km jihovýchodně od středu obce Chvalčov. Přírodní památka Na Jančích představuje zachovalou podhorskou louku s tůněmi uprostřed lesního komplexu na mírně ukloněném svahu s převážně jihozápadní orientací v nadmořské výšce 522 až 573 m n. m., asi 250 m severně od rekreačního střediska Na Valaškách, 850 m západně od kóty Goralica (715,5 m n. m.) a 2,5 km JV. od středu obce Chvalčov. Částí území prochází lesní cesta s zeleně vyznačenou turistickou trasou. Na severní straně přímo navazuje větší louka, která je evidována jako významný krajinný prvek Horní Janče. Tato louka je rovněž ohraničena okrajem lesního komplexu.

Geomorfologie

Z hlediska zařazení do geomorfologického systému zájmové území spadá do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západní Beskydy, celku Hostýnsko-vsetínská hornatina, podcelku Hostýnské vrchy a okrsku Rusavská hornatina (Mackovčín et al. 2006).

Reliéf je plochý.

Geologie a pedologie:

Podklad je tvořen mořskými flyšovými sedimenty godulského vývoje slezské jednotky - převážně jílovcového až jílovcovo - pískovcového flyšového vývoje se střídáním vápnitých a nevápnitých hornin. V půdním pokryvu převažují pseudoglej modální, kambizemě (modální, dystrická).

Klima:

Dle klimatogeografického členění ČSR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v klimatické oblasti MT2 (Quitt 1971). Charakterizuje ji krátké a mírné jaro, podzim je krátký a mírný (průměrná teplota v dubnu a říjnu je 6-7 °C), léto je krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké s průměrným počtem 20-30 letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25°C a vyšší) v roce a s průměrnou červencovou teplotou 16-17 °C, zima je mírná, normálně dlouhá, suchá s normálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových dnů, tj. dnů s maximální teplotou pod 0°C, je 40 až 50 v roce a průměrná lednová teplota je zde -3 až -4°C). (Quitt 1971).

Fauna a flóra:

Z hlediska regionálně-fytogeografického (Skalický, 1988) náleží území k fytogeografické oblasti mezofytika /Mesophyticum/-M, fytogeografickému obvodu Karpatského mezofytika /Mesophyticum Carpathicum/-Karp. M, a fytogeografickému okresu 81-Hostýnské vrchy.

Podle Biogeografického členění České republiky (Culek [ed.], 1996) je území součástí biogeografického regionu 3.8. Hostýnské vrchy. Bioregion zahrnuje biocenózy 4. a 5. vegetačního stupně, tvořené typickými karpatskými bučinami, suťovými lesy a jejich náhradními stanovišti. Charakteristické je velké zastoupení subatlantských prvků a typických bučinných druhů. Zcela dnes převládají lesy, hlavně smrkové kultury, zastoupení původních bučin je také významné, místy i s přežívající jedlí.

Potenciální přirozenou dřevinnou vegetaci dle Neuhauslové et al. (1997, 1998) tvoří Květnaté bučiny (*Eu-Fagenion*), 18. Bučina s kyčelnicí devítilistou (*Dentario-enneaphylli-Fagetum*).

Lesní biotopy náleží především ke květnatým bučinám (L5.1) s typickými karpatskými druhy asociace *Dentario enneaphylli-Fagetum*. Vyvinuté bývá i keřové patro a druhově bohatší patro bylinné. V závislosti na hospodářském lesnickém využívání území zde tvoří stále asi 26 % rozlohy EVL lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami (X9A).

Z nelesní vegetace jsou zastoupeny biotopy zahrnující mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9).

Díky pestrému složení lesních společenstev je lokalita zajímavá i ze zoologického hlediska. Rozsáhlé lesní biotopy jsou vhodným hnízdištěm řady druhů ptáků. Zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesního charakteru jsou nejvýznamnějšími lokalitami strakapouda bělohřbetého (*Dendrocopos leucotos*) v Hostýnských vrších. Významným druhem je i lejsek malý (*Ficedula parva*), který poměrně hojně obývá horské lesy s převahou buků. Oba zmiňované druhy jsou předmětem ochrany v Ptačí oblasti - Hostýnské vrchy a územně se překrývá s územím EVL. Druhově bohatá je také fauna obojživelníků vázaná na četné drobné vodoteče, tůň a mokřadní biotopy, z nichž především čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek horský (*Ichthyosaura alpestris*), a čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*). Stálými druhy na lokalitě jsou také užovka obojková (*Natrix natrix*), skokan hnědý (*Rana temporaria*) a skokan štihlý (*Rana dalmatina*).

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

druh	kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.	stupeň ohrožení*	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky
Cévnaté rostliny			
snědek pyrenejský kulatoplodý (<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i>)	KO	EN	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu: 10.7.1946-plný květ, Hynek Zavřel-1. zmínka, 15.4.2015, 300 listových růžic, většina listů již poškozena okusem, 16.6.2015, 201 nakvétajících rostlin, zčásti spasené 4.8.2015, 35 rostlin s částečně zralými semeníky, všechny ostatní rostliny zjištěné 16.6.2015 spasené, poškozování okusem. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.
mečík střechovitý (<i>Gladiolus imbricatus</i>)	SO	VU	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky, trpí okusem zvěře. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.
vstavač mužský znamenáný (<i>Orchis mascula</i> ssp. <i>signifera</i>)	SO	EN	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.

prstnatec májový (<i>Dactylorhiza majalis</i>)	O	NT	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 (zdroj: ND, Večeřa P., 3.6.2025) v počtu 16 kvetoucích jedinců; v roce 2017 (zdroj: ND, Svačina T., 2017) byl také zaznamenán prstnatec májový pravý - bez uvedení početnosti, obdobně v roce 2005 (zdroj: ND, Svačina T., 2005).
vstavač osmahlý (<i>Orchis ustulata</i>)	SO	CR	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z let 2013-2015- 5-10 ex. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP.
Ptáci			
sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>)	KO	EN/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2023 v počtu 2 jed. (zdroj: ND, Nedbal O. a L., 2023).
strakapoud bělohřbetý (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	SO	EN/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2023 v počtu 1 samice (zdroj: ND, Nosek F., 2023); v roce 2022 v počtu 1 jed. (zdroj: ND, Beran J., 2022); v roce 2021 v počtu 1 jed. (zdroj: ND, Abrahánek Z., 2021); v roce 2020 v počtu 1-2 jed. (zdroj: ND, Brandl P., 2020 + Abrahánek Z., 2020).
lejsk malý (<i>Ficedula parva</i>)	SO	VU/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2023 v počtu 2 jed. (zdroj: ND, Novák J., 2023); v roce 2022 v počtu 1 jed. (zdroj: ND, Novák J., 2022); v roce 2020 v počtu 1 samec (zdroj: ND, Šafránek J., 2020).
datlík tříprstý (<i>Picoides tridactylus</i>)	SO	EN/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2020 v počtu 1 samice + 1 samec (zdroj: ND, Nosek F., 2020 + Mach J., 2020).
Plazi			
užovka obojková (<i>Natrix natrix</i>)	O	NT	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 1 subadult (zdroj: ND, Večeřa P., 12.8.2025); dále v roce 2023 v počtu 1 subadult (zdroj: ND, Svačina T., 2023); v roce 2022 v počtu 1 jed. (zdroj: ND, Svačina T., 2022); v roce 2020 v počtu 1 adult (zdroj: ND, Šandor G., 2020).
slepýš východní (<i>Anguis colchica</i>)	-	NT	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 1 adult a 1 mládě (zdroj: ND, Trávníčková J., Večeřa P., 2025).
Obojživelníci			
čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>)	SO	EN/Příloha II a IV	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 17 samic a 20 samců (zdroj: ND, Trávníčková J., Večeřa P., 2025); v roce 2024 zaznamenání juvenilové (zdroj: ND, Brož Z., 2024); v roce 2023 v počtu 1-3 adulti a 2 metamorf. ex. (zdroj: ND, Svačina T., 2023), ve stejném roce jiné záznamy o počtu 22 samců a 9 samic (zdroj: ND, Večeřa P., 2023); v roce 2021 v počtu 2 larvy + 3 adulti (zdroj: ND, Svačina T., 2021); v roce 2020 v počtu 7 samic + 1 samec (zdroj: ND, Šandor G., 2020).

čolek horský (<i>Ichthyosaura alpestris</i>)	SO	VU	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 4 samice a 10 samců (zdroj: ND, Trávníčková J., Večeřa P., 2025); v roce 2024 v počtu 2 samci (zdroj: ND, Brož Z., 2024); v roce 2023 v počtu 1 adult a larvy (zdroj: ND, Svačina T., 2023), ve stejném roce jiné záznamy o počtu 1 samec a 4 samice (zdroj: ND, Večeřa P., 2023); v roce 2022 v počtu 4 samice a 5 samců (zdroj: ND, Svačina T., 2022); v roce 2021 v počtu 1-2 samice (zdroj: ND, Svačina T., 2021); v roce 2020 v počtu 1 samice + 1 samec (zdroj: ND, Šandor G., 2020).
čolek obecný (<i>Lissotriton vulgaris</i>)	SO	VU	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 5 samic a 15 samců (zdroj: ND, Trávníčková J., Večeřa P., 2025); v roce 2024 v počtu 5 samců, 9 samic a juvenilové (zdroj: ND, Brož Z., 2024); v roce 2023 v počtu 1-3 adulti (zdroj: ND, Svačina T., 2023), ve stejném roce jiné záznamy o počtu 10 samců a 2 samice (zdroj: ND, Večeřa P., 2023); v roce 2022 v počtu 12-15 samců a 7 samic (zdroj: ND, Svačina T., 2022); v roce 2020 v počtu 1-2 samci (zdroj: ND, Šandor G., 2020).
skokan hnědý (<i>Rana temporaria</i>)	SO	VU	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2024 - snůšky (zdroj: ND, Brož Z., 2024); v roce 2023 larvy + 150 snůšek (zdroj: ND, Svačina T., 2023); v roce 2022 30 snůšek (zdroj: ND, Svačina T., 2022); v roce 2020 snůšky (zdroj: ND, Šandor G., 2020).
skokan štíhlý (<i>Rana dalmatina</i>)	SO	NT/Příloha II a IV	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 v počtu 250 snůšek a 2 jedinci (zdroj: ND, Trávníčková J., 2025); v roce 2023 v počtu 50 snůšek (zdroj: ND, Svačina T., 2023); v roce 2022 larvy + 50 snůšek (zdroj: ND, Svačina T., 2022); v roce 2020 v počtu 150-200 snůšek, 5 jed a larvy (zdroj: ND, Šandor G., 2020).
skokan zelený komplex (<i>Pelophylax esculentus</i> s. l.)	SO	NT/Příloha II a IV	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2025 bez uvedení početnosti (zdroj: ND, Trávníčková J., Večeřa P., 2025).
rosnička zelená (<i>Hyla arborea</i>)	SO	NT/Příloha II a IV	Dle údajů v ND byl druh na území PP zaznamenán v roce 2021 v počtu 4 samci (zdroj: Svačina T., 2021).
Sovy			
kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>)	SO	VU/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh v rámci širšího území PP zaznamenán v roce 2024 v počtu 1 jed. (zdroj: ND, Nedbal L. a O., 2024).
puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>)	KO	CR/Příloha I	Dle údajů v ND byl druh v rámci širšího území PP zaznamenán v roce 2021 v počtu 34 jed. (zdroj: ND, Beran J., Shromáždil P., Němeček Z., 2021).

* stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:

Grulich & Chobot (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. Cévnaté rostliny. Příroda 35, Praha, 178 s.
Chobot & Němec (2017): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky. Obratlovci. Příroda 34, Praha, 94 s.

CR - kriticky ohrožený
EN - ohrožený druh
VU - zranitelný druh
LC - málo dotčený druh

NT - téměř ohrožený druh

Kategorie dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.:

O - ohrožený druh

SO - silně ohrožený

KO - kriticky ohrožený druh

Evropsky významný druh:

- druh zařazený v přílohách směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Příloha II - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany,

Příloha IV - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu,

- druh dle Směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně volně žijících ptáků 2009/147/ES tzv. „směrnice o ptácích“, **Přílohy I**

Dle údajů v ND (nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR) byly aktualizovány nálezy a záznamy o druzích v PP. Nejvýznamnější druhy jsou uvedeny v tabulce výše v rámci posledních 5 let. Řada druhů má v území PP stabilní výskyt sahající až do 80. let minulého století. Několik druhů zmíněných v předchozím plánu péče nebylo přeneseno, neboť jejich výskyt není žádným recentním záznamem doložen, chybí příslušné průzkumy, které by jejich zastoupení potvrdily či vyvrátily. Provedení botanického průzkumu lokality je považováno za nezbytné, minimálně z důvodu ověření stavu populace předmětu ochrany a to snědku kulatoplodého, o němž aktuálně nejsou žádné relevantní informace.

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

S ohledem na předmět ochrany ZCHÚ nejsou abiotické disturbanční činitele v území v současné době identifikovány.

b) biotické disturbanční činitele

Z biotických disturbančních činitelů je nejvýznamnější vliv kůrovce na populaci smrku ztepilého v širším okolí. S předmětným disturbančním činitelem souvisí negativní vliv expanzivních a invazivních druhů rostlin (zarůstání ostružiníkem (především v jihozápadní části území), místy pronikání náletů břízy a expanze třtiny křovištní, které se šíří z ploch po zpracovávání kůrovcové kalamity, kde došlo k plošným nahodilým těžebním zásahům. Expanze travobylinných společenstev do ZCHÚ může negativně ovlivňovat populační četnost předmětů ochrany.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody

Lokalitu poprvé zmiňuje Zavřel (1947) ve svém článku Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích, kde louky „Na Jančích“ popisuje jako přirozené horské lučiny mezi lesy. Uvádí, že část pozemků na jižních výslunných sklonech, dříve obhospodařovaná jako

pole byla ponechána přirozenému zatravnění. Článek je věnován převážně snědku, proto je v článku mimo jiné popisováno, že snědek roste na sušších místech v dolní části luk, „pod cestou poblíž lesa, kde se střídají sušší vyvýšeninky s mokřými dolíky, pramenisky a příkopky“. Z významnějších druhů je v předmětném článku z druhů, které nebyly v recentní době v území zjištěny např. *Epipactis palustris*, *Orchis maculata* a *O. morio*. V roce 1956 bylo území vyhlášeno jako státní přírodní rezervace. Dle ústního sdělení bývalých pracovníků lesního závodu bylo asi do 80 let minulého století prováděno pravidelné sečení louky v PP.

Neobhospodařování resp. nepravidelné obhospodařování v území PP mělo za následek negativní změny biotopů, příp. ochuzení druhového složení. Toto dokládá i Láznička (1985), který uvádí, že sušší trvalé travní plochy mají charakter lad, neboť nejsou několik let obhospodařovány. V území PP popisuje výskyt druhů *Iris sibirica*, *Cephalanthera damasonium*, *Geranium sanguineum* (?), *Eriophorum angustifolium*, *E. latifolium* a *Epipactis palustris*, které se již nepodařily od té doby prokázat.

Po tomto období nebylo území využíváno do roku 1993, kdy začal být prováděn management podle tehdejšího plánu péče 1993-2002 (sečení vlhčí části jednou za dva roky v červenci-září a sušší každoročně po 15. červenci).

V letech 2000-2003 bylo prováděno sečení celé plochy každoročně v pozdním termínu. Během posledních 10 let bylo prováděno jednoroční fázové sečení v souladu s předchozím plánem péče (dílní plochy se sekly v termínech vhodných pro jednotlivé druhy, přičemž docházelo k jejich střídání). Plocha nad lesní cestou byla dle potřeby sečena i 2x ročně. Během platnosti předchozího plánu péče byly také zčásti redukovány náletové dřeviny na obvodu PP, zejména kolem lesní cesty, došlo k odstranění všech smrků ztepilých a byla také redukována bříza bělokorá.

b) lesní hospodářství

Vliv lesního hospodaření se ZCHÚ souvisí nepřímě. V souvislosti se sanací kůrovcem napadených lesních porostů po roce 2020 dochází ke změnám vodního režimu v lokalitě.

c) zemědělské hospodaření

Dle Kolbingra a Hradilové (2011) se v oblasti PP nacházela středověká ves Janče, popisová již na konci 14. století jako pustá. Jak je uvedeno i výše na části pozemků se mohla do 50. let minulého století nacházet i pole, ale dle konfigurace terénu to bylo spíše na území navazujícího významného krajinného prvku Horní Janče. Spolu s tímto územím se asi do 80. let minulého století nepravidelně sklízelo i z plochy PP seno pro koně lesního závodu. V současné době není území zemědělsky využíváno.

d) myslivost

Zájmové území je součástí honitby CZ7201210002-Bystřičky. Populace ohrožených a chráněných druhů rostlin jsou poškozovány daňkem skvrnitým (především výrazným omezením reprodukce spásením většiny generativních částí rostlin). Mechanické poškození (sešlap, eroze) nebo eutrofizace se ve větší míře zatím neprojevuje.

V severní části ZCHÚ bylo zaznamenáno poškození lokality prasetem divokým.

V důsledku vysokého stavu zvěře (především daňka evropského) v honitbě dochází k okusu ještě nezralých generativních částí rostlin (zejména tobolek kriticky ohroženého druhu snědek

pyrenejský kulatoplodý (*Ornithogalum pyrenaicum* ssp. *sphaerocarpum*) v roce 2015 z 201 kvetoucích rostlin zůstalo pouze 35 do doby vysemenění a také silně ohroženého mečíku střečovitého (*Gladiolus imbricatus*) a méně často i orchidejovitých rostlin.

Přikrmování zvěře se na území vlastní přírodní památky v současné době neprovádí. Zjištěny nebyly ani jiná myslivecká zařízení jako posedy, kazatelny apod.

e) rekreace a sport

PP prochází zeleně značená turistická trasa (Naučná stezka Hostýnské vrchy), poškození území nebylo v souvislosti s jejím využíváním zjištěno.

f) jiné způsoby využívání

Významným negativním vlivem v území je existence lesní cesty, která vede axiálně územím západ ↔ východ. V minulosti bylo zamezeno její odvodňování do příkopů. Nicméně negativní vliv zpevněného povrchu vozovky s absencí příčných svodnic na vodní režim přetrvává. Tento negativní vliv je technicky částečně řešitelný.

Přílohy:

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

M4 - Mapa biotopů

M5 - Mapa historická - monochromatické ortofoto z 50-tých let

M6 - Mapa historická – monochromatické ortofoto z roku 1999

M7 - Mapa historická - ortofoto z roku 2003

M8 - Mapa historická - ortofoto z roku 2006

M9 - Mapa historická - ortofoto z roku 2009

M10 - Mapa historická - ortofoto z roku 2012

M11 - Mapa historická - ortofoto z roku 2014

M12 - Mapa historická - ortofoto z roku 2016

M13 - Mapa historická - ortofoto z roku 2018

M14 - Mapa historická - ortofoto z roku 2020

M15 - Mapa historická - ortofoto z roku 2022

M16 - Mapa - ortofoto z roku 2025

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

- Územní plán obce Chvalčov (k 30.9.2009, úplné znění po vydání změny č. 2 - září 2022)
- Výnos Ministerstva školství kultury č. 17.835/55 ze dne 17. 2. 1956 o zřízení státní přírodní rezervace „Na Jančích“.
- Nařízení vlády č. 22/2005 Sb., částka 5, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

Popis charakteru ploch mimo lesní pozemky je uveden tabelární formou dle vymezených dílčích ploch v příloze T2.

Přílohy:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup

V území pokračovat v managementu lučních ploch, tedy tyto plochy kosit 1x až 2x ročně, a biomasu odvážet z lokality. Je možné strojové sečení, pokud to místní podmínky dovolí a nehrozí vytváření hlubokých kolejí.

Rovněž je nutné udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, včetně redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví.

U podmáčených ploch je nutná důsledná redukce náletu dřevin a expanzního ostružiníku ve prospěch lučních společenstev.

Podpořit ekologickou a statickou stabilitu doprovodné liniové vegetace redukcí keřového patra a uvolněním stromů.

Pro zlepšení vodního režimu v lokalitě, především jižní části instalovat svodnice ve zpevněné lesní cestě.

Je nutné sanovat provozně nebezpečné stromy podél turistické stezky.

Je potřeba, aby se důsledně dodržoval platný plán péče o lokalitu. V lokalitě je nutné aktualizovat inventarizační průzkumy, na základě provedených změn intenzitu/sezónní načasování zásahů, především s ohledem na zvláště chráněné a ochrannářsky významné druhy rostlin a živočichů vázaných na luční společenstva; především lepidoptera.

A. ekosystémy

ekosystém:	T1.9. Střídavě vlhké bezkolencové louky		
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům		
• rozloha ekosystému v PP (cca 10%)	Z údajů mapování biotopů (aktualizace 2007–2023) činí rozloha ekosystému 9,54 % výměry ZCHÚ.		
	stav:	dobrý	
	trend vývoje:	setrvalý	
• absence invazních a expanzivních druhů rostlin	V jižní a západní části ZCHÚ po okrajích na kontaktu s lesními společenstvy degraduje biotop expanze třtiny křovištní a ostružiníku.		
	stav:	zhoršený	
	trend vývoje:	zhoršující se	

B. druhy

druh:	vstavač osmahlý (<i>Orchis ustulata</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
min. nižší desítky jedinců	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z let 2013-2015- 5-10 ex. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP. Vstavač osmahlý je ohrožen zejména sekundární sukcesí, likvidací lokalit a aplikací organických a anorganických hnojiv. Růžice listů vyrůstají na podzim (říjen) a přezimují, v době květu již často zasychají. Na rozdíl od ostatních vstavačů, které jsou opylovány většinou včelami a čmeláky, je vstavač osmahlý nejčastěji opylován mouchami z rodu kuklice.	
	stav:	zhoršený
	trend vývoje:	neznámý

druh:	snědek pyrenejský kulatoplodý (<i>Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
min. vyšší desítky jedinců	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu: 10.7.1946-plný květ, Hynek Zavřel-1. zmínka, 15.4.2015, 300 listových růžic, většina listů již poškozena okusem, 16.6.2015, 201 nakvétajících rostlin, zčásti spasené 4.8.2015, 35 rostlin s částečně zralými semeníky, všechny ostatní rostliny zjištěné 16.6.2015 spasené, poškozování okusem. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP. Limitním faktorem pro snědek je způsob hospodaření (sukcesní změny stanoviště v důsledku příliš intenzivního, změněného nebo nevhodného managementu) a poškozování rostlin okusem zvěře, v lesních porostech jsou to pak i světelné podmínky. Ojedinelé dochází i k přímému poškozování lokalit a to jak rytím prasat divokých při hledání potravy, tak lidskou činností např. při těžbě lesních porostů. Společným jmenovatelem vegetace se snědkem je nízká frekvence a intenzita disturbancí nebo v případě pravidelných disturbancí spojených s managementem sezónně pozdní načasování zásahů, dostatek světla od plného oslunění po alespoň polostín a nízké až střední zásobení vodou, bez trvalého zamokření.	
	stav:	zhoršený
	trend vývoje:	neznámý

druh:	vstavač mužský znamenáný (<i>Orchis mascula ssp. signifera</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
min. nižší desítky jedinců	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP. Hlavním důvodem klesajícího počtu lokalit vstavače mužského z. jsou změny (intenzifikace) v zemědělství, obnova travních porostů orbou, dosévání travních směsí a s tím spojené změny stanovištních podmínek. Ohrožuje ho i opačný stav, tj. ponechání luk a pastvin ladem. Je to vytrvalá bylina přezimující kořenovými hlízami. Jako všechny naše orchideje potřebuje i vstavač mužský pro úspěšné vyklíčení a další vývoj vytvořit symbiózu s určitým druhem hub (tzv. mykorrhiza).	
	stav:	neznámý
	trend vývoje:	neznámý

druh:	mečík střechovitý (<i>Gladiolus imbricatus</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
• min. nižší desítky jedinců	Dle předchozího plánu péče jsou záznamy o druhu z roku 2015 - desítky, trpí okusem zvěře. V ND nejsou k tomuto druhu uvedeny žádné záznamy, proto nemůže být provedena jejich aktualizace. Současně nebyl proveden žádný botanický průzkum na území PP. V minulosti mnoho lokalit zaniklo vlivem vodohospodářských úprav (odvodnění), ohrožuje ho nevhodné obhospodařování luk a vzhledem k atraktivnímu vzhledu představuje možné ohrožení také vykopávání do zahrádek a trhání do kytic.	
	stav:	<i>neznámý</i>
	trend vývoje:	<i>neznámý</i>

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize zájmů ochrany území se nepředpokládají, prioritou je zajištění obnovy populací předmětů ochrany.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Ekosystém	Dílčí plocha 1A, 1B, 2B, 2C, 3, 7A, 7B
Typ managementu	Ruční kosení s odvozem biomasy, včetně odstranění drobného náletu
Vhodný interval	1x ročně
Minimální interval	1x za 2 roky
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ručně vedená sekačka s přizvednutou lištou na 10-15 cm / kosa
Kalendář pro management	Červenec-září
Upřesňující podmínky	Pravidelné jednoroční ruční kosení (1-2x na vybraných dílčích plochách viz T2). Pokosenou biomasu je možné buď sušit na ploše (pokud není příliš vlhká) a následně shrbat a seno odvázet (nenechávat na ploše déle než 10 dní), pokud není vhodné počasí na sušení je nutné biomasu z lokality odstranit co nejdříve. Zásah je vhodné plánovat s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (např. aby došlo k reprodukci zvl. chráněných rostlin). Je možné provést kompostování biomasy a to v menších kupkách při okraji lokality. Tyto kupky mohou být využívány obojživelníky a plazi. Nekosit při zvýšené aktivitě obojživelníků, tj. za mokra, po dešti. Jako alternativní způsob je možné aplikovat kosení lehkou mechanizací. Při používání lištových sekaček je nutno přizvednutí lišty alespoň na 10-15 cm, nepoužívat bubnové sekačky, s ohledem na obojživelníky. Toto podpoří současně také zachování druhové pestrosti rostlin. Je nutné zamezit dalšímu rozšiřování porostů dřevin včetně keřů (mimo jalovce obecného a vřesu). Nelze přihnojovat a vápnit. Všechny plochy se musí kosit až k okrajům, od kterých dochází k invazi <i>Calamagrostis epigejos</i>. V případě DP 2C - sečení dvou izolovaných mikrolokalit s <i>Gladiolus imbricatus</i> v jižní části plochy provádět až v srpnu-září.

Ekosystém	Dílčí plocha 8
Typ managementu	Sečení mechanizací
Vhodný interval	1-2x ročně (dle klimatického vývoje)
Minimální interval	1x ročně
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Křovinořez, sekačka
Kalendář pro management	Červen až září
Upřesňující podmínky	Strojové sečení přiléhajících travnatých pásů a příkopů. (křovinořez, sekačka)

Ekosystém	Dílčí plocha 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G
Typ managementu	Likvidace dendromasy s odvozem mimo ZCHÚ
Vhodný interval	dle potřeby
Minimální interval	1x za 5 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Křovinořez, motorová pila, motorový zastřihovač větví
Kalendář pro management	Září-březen (mimo hnízdní období)
Upřesňující podmínky	Odstranění náletu dřevin křovinořezy či pilami. Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech. Opatření provádět dle potřeby, aby nedošlo ke zvýšení zastínění lokality nebo zmenšení její plochy či lučních společenstev. Zásah je orientovaný do zimního období. Pro eliminaci invazních druhů, jako je např. trnovník akát (<i>Robinia pseudoacacia</i>), je možná aplikace kontaktního herbicidu - použití vždy konzultovat s příslušným OOP.

Ekosystém	Dílčí plocha 2D
Typ managementu	Dosev ploch s narušeným povrchem regionální luční směsí.
Vhodný interval	Dle potřeby
Minimální interval	Dle potřeby
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ručně, osivo regionální luční travní směsi, hrábě
Kalendář pro management	Duben-květen
Upřesňující podmínky	Dosev ploch s narušeným povrchem, využít regionální luční směs.

Ekosystém	Dílčí plocha 2D
Typ managementu	Liniová výsadba stromů
Vhodný interval	Jednorázově (na začátku období platnosti plánu péče)
Minimální interval	Jednorázově
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Sazenice, ruční nářadí
Kalendář pro management	Říjen-listopad, březen-duben
Upřesňující podmínky	Stabilizovat severní hranici DP 2D (hranice PP na kontaktu s OP) liniovou výsadbou stromů - 23 ks, spon 10m, střídavě třešň ptačí/dub letní.

Ekosystém	Dílčí plocha 3, 5B, 5D, 5E, 5F
Typ managementu	Výřez keřového patra
Vhodný interval	1x za 5 let
Minimální interval	1x za 5 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Křovinořez
Kalendář pro management	Září-březen (mimo hnízdní období)
Upřesňující podmínky	Provést výřez keřového patra křovinořezem. Na DP 5B - redukce keřového patra zaměřit na ostružiník/ zmlazení keřů růže šípkové.

Ekosystém	Dílčí plocha 3
Typ managementu	Redukce stromového patra
Vhodný interval	1x za 10 let
Minimální interval	1x za 10 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Motorová pila
Kalendář pro management	Září-březen (mimo hnízdní období)
Upřesňující podmínky	Redukce stromového patra (motorovou pilou). Přednostně břízu bělokorou a buk lesní. Ponechat nadějně solitéry olše lepkavé. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech. Po odstranění dendromasy provádět sečení 1x ročně.

Ekosystém	Dílčí plocha 5A, 5C, 5D, 5E, 5F
Typ managementu	Sanace provozně nebezpečných jedinců
Vhodný interval	Bezodkladně
Minimální interval	Dle potřeby
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Motorová pila
Kalendář pro management	Bezodkladně
Upřesňující podmínky	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.

Ekosystém	Dílčí plocha 5B, 5D, 5E, 5F
Typ managementu	Prořezávka/probírka
Vhodný interval	1x za 10 let
Minimální interval	1x za 10 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Motorová pila
Kalendář pro management	Září-březen (mimo hnízdní období)
Upřesňující podmínky	Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.

Ekosystém	Dílčí plocha 7A, 7B
Typ managementu	Redukce semenáčků
Vhodný interval	Dle potřeby
Minimální interval	-
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ručně
Kalendář pro management	Červenec
Upřesňující podmínky	Redukce semenáčků, příp. odstranění spadlých větví z navazujících lesních porostů. Po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.

Ekosystém	Dílčí plocha 8
Typ managementu	Instalace příčné svodnice
Vhodný interval	Jednorázově
Minimální interval	-
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ručními nástroji - krumpáč, lopata, svodnice,
Kalendář pro management	Mimo období rozmnožování obojživelníků (červen - leden)
Upřesňující podmínky	Instalace příčné svodnice 2x. V centrální části DP (propojení DP 7B a 1B) a v západní části (propojení západní části DP 5B a 5E.

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Pravidelným sečením zabránit rozšiřování invazi *Calamagrostis epigejos* především z okrajových partií PP (viz příslušná rámcová směrnice hospodaření).

Likvidace invazních druhů by měla být v souladu se standardem MŽP ČR - Standardy péče o přírodu a krajinu - Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (SPPK D02 007:2016) a měla by být prováděna specializovaným subjektem s odpovídajícími zkušenostmi a praxí.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) ekosystémy mimo lesní pozemky

Popis navrhovaných zásahů je uveden v příloze T2 dle vymezených dílčích ploch.

Příloha:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V části ochranného pásma, která zaujímá travní porosty (Horní Janče) hospodařit obdobně jako v PP (jednoroční sečení v pozdějším termínu) - výskyt *Ornithogalum pyrenaicum* ssp. *sphaerocarpum* a *Gladiolus imbricatus*. Při lesním hospodaření v ochranném pásmu s lesním porostem nevyužívat plochu PP pro pojiždění lesnické ani jiné mechanizace a neukládat zde dřevo z těžby nebo těžební zbytky.

Neumísťovat krmeliště a nepřikrmovat zvěř.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

V území byly v roce 2025 dohledány 3 stojany po obvodu PP se státním znakem (příp. s velkým infopanelem)

Západní část DP 8 - malý státní znak s tabulí s textem „Přírodní památka“ na dřevěném sloupku

Východní část DP 8 - malý státní znak s tabulí s textem „Přírodní památka“ na dřevěném sloupku – poškozený -

Centrální část DP 8 - malý státní znak vč. nápisu „přírodní památka“ na dřevěném sloupku –

Všechny stojany se státním znakem vyžadují v krátkodobém horizontu (1. ½ platnosti) údržbu.

Geodetické zaměření v území nebylo provedeno, v průběhu platnosti plánu péče se doporučuje toto provést (890m), vč. označení lomových bodů hraničními mezníky (8ks)

Pruhové značení místy není v území patrné, začátkem období platnosti bude nutné jej obnovit (PP 680 m)

Severní hranice PP podél hranice dílčí plochy 2D není v terénu patrná, bude ji potřeba označit, je navržena liniová výsadba stromů - 23 ks – viz. příloha T2.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Definice předmětu ochrany v současně platném zřizovacím předpisu není dostatečně specifikována, proto se navrhuje přehlášení území PP s redefinicí předmětu ochrany, doplněním o ekosystém uvedený v kapitole 1.7.2. a doplněním ZCHD rostlin po aktualizaci inventarizačních průzkumů.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

V případě ořezů dřevin či kácení mimo PUPFL je nutná výjimka povolená příslušným orgánem ochrany přírody.

Všechny realizované zásahy navrhované v tomto plánu péče je nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Stávající režim rekreačního využití území v současné době není potřeba regulovat.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

V území je instalovaná 1 infocedule, aktuálně v dobrém stavu. Zkontrolovat její stav v polovině platnosti plánu péče. V případě výměny aktualizovat údaje dle provedených inventarizačních průzkumů.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

S ohledem na předměty ochrany se v území doporučuje provést v 3 - 5-letém intervalu botanický a fytocenologický inventarizační průzkum.

Jednou za období platnosti provést v PP:

aktualizovat inventarizační průzkum se zaměřením na herpetofaunu

aktualizovat ornitologický průzkum

entomologický průzkum se zaměřením na řád Lepidoptera

entomologický průzkum se zaměřením na řád Odonata

inventarizační průzkum mechorostů

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

Kalkulace byla provedena dle nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO MŽP), které jsou vyjádřeny cenami běžných činností (v Kč), které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Znění NOO MŽP použito při kalkulaci je platné od 1. 11. 2025, dostupné z: <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/prehled-dotaci/naklady-obvyklych-opatreni>

Druh zásahu (činnost)	Odhad množství (např. plochy)	Četnost zásahu za období plánu péče	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
PP			
Sečení 1x ročně s odvozem biomasy	1,15 ha	10 x	441 700,-
Sečení těžkou mechanizací 1-2x ročně s odvozem biomasy (DP 8)	0,21 ha	15 x	97 196,-
Odstranění náletu dřevin	1,59 ha	2 x	209 600,-
Dosev plochy regionální luční směsí (DP 2D)	0,05 ha	1 x	7 330,-
Liniová výsadba stromů (DP 2)	23 ks	1 x	149 200,-
Výřez keřového patra s odvozem biomasy	0,27 ha	2 x	52 400,-
Redukce stromového patra (DP 3) s odvozem biomasy	0,03 ha	1 x	12 000,-
Prořezávka/probírka	0,24 ha	1 x	10 000,-
Instalace příčné svodnice (2ks)	2 ks	1 x	33 200,-
Geodetické zaměření PP	890 m	1 x	43 270,-
Stabilizace lomových bodů PP mezníkem (ks)	8 ks	1 x	7 800,-
Obnova pruhového značení PP	680 m	1 x	1 816,-
Oprava stojanů se státním znakem	3 ks	1 x	8 740,-
N á k l a d y c e l k e m (Kč)			1 074 252,-

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

AOPK ČR (2019): Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Hostýnské vrchy. 2019. 27 s.

AOPK ČR (2013): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ0723406 Chvalčov. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín. Pazderková M., 2013. 10 s.

AOPK ČR (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ0724429 Hostýnské vrchy. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty, Pazderková M., Ohryzek J., Vočadlova M. 2015. 29 s.

Anonym: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Anonym: Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Culek M. (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma Praha, 347 pp.

Demek J., Macovčín P. eds. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: AOPK ČR, 580 s.

Hejda, Farkač & Chobot (2017): Červený seznam ohrožených druhů ČR. Bezobratlí. Příroda 36:177-233, Praha.

Gulich V. & Chobot K [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda 35, Praha, 178 s.

Chobot & Němec (2017): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky. Obratlovci. Příroda 34, Praha, 94 s.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Gulich V., Lustyk P. eds. (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Praha: AOPK ČR.

Mackovčín, P. (ed.) et al. (2006). Mapy geomorfologického členění: Geomorfologické jednotky ČR 2005 Mapová příloha, s. 533-543. In: DEMEK, J.; MACKOVČÍN, P. (eds.) et al. Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Vydání II. Brno: AOPK ČR. 582 s., 1CD. ISBN 80-86064-99-9

Neuhäuslová Z., Moravec J., Chytrý M., Sádlo J., Rybníček K., Kolbek J., Jirásek J. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997.

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České socialistické republiky 1: 103–121, Academia, Praha.

Quitt E. 1971: Klimatické oblasti ČSR. Mapa 1: 500 000.

Svačina T. (2016): Plán péče o přírodní památku Na Jančích na období 2016-2025. 42 s.

Zdroje online:

- Přírodní biotopy a habitaty dle vrstvy Přírodní biotop aktualizace 2007 – 2020 a Habitat aktualizace 2007 – 2020 WMS AOPK ČR.
- Nálezová databáze ochrany přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
<https://portal.nature.cz/nd/>
- Taxonomický klasifikační systém půd ČR
<http://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showHomePage>
- Metodický pokyn k přípravě a zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma (Aktualizovaná Osnova účinná od 1.1.2019)
https://www.mzp.cz/cz/osnova_planu_pece
- digitální vektor parcel KN
<http://services.cuzk.cz/>

4.3 Seznam používaných zkratek

GIS – geografický informační systém
 IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody
 JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
 KN – katastr nemovitostí
 MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území
 ND – nálezová databáze
 OP – ochranné pásmo
 OOP – orgán ochrany přírody
 PP – přírodní památka
 ÚSES – územní systém ekologické stability
 WMS - webová mapová služba
 ZCHD – zvláště chráněný druh
 ZCHÚ – zvláště chráněné území

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Pro Koalici pro řeky z. s. zpracoval Ing. Marián Horváth, Ph.D. a Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph.D.

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

5. Přílohy

Mapy:

Příloha M1 - **Orientační mapa s vyznačením území**

Příloha M2 - **Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma**

Příloha M3 - **Mapa dílčích ploch a objektů**

Příloha M4 - **Mapa biotopů**

Příloha M5 - **Mapa historická - monochromatické ortofoto z 50-tých let**

Příloha M6 - **Mapa historická – monochromatické ortofoto z roku 1999**

Příloha M7 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2003**

Příloha M8 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2006**

Příloha M9 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2009**

Příloha M10 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2012**

Příloha M11 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2014**

Příloha M12 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2016**

Příloha M13 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2018**

Příloha M14 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2020**

Příloha M15 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2022**

Příloha M16 - **Mapa - ortofoto z roku 2025**

Tabulky:


Příloha T2 - **Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich**

Vrstvy:

Příloha V1 - **Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch**

Přílohy


Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území



Měřítko 1:5000

Podklad zdroj: ZM 25 – WMS ČÚZK

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma




Měřítko 1:5000

Hranice parcel – shp dostupné na <https://services.cuzk.cz/>

Podklad zdroj: Ortofoto - WMS Google Satellite


Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů



Měřítko 1:10 000

Podklad zdroj: Ortofoto - WMS Google Satellite

Příloha M4 - Mapa biotopů



Měřítko 1:10 000

Podklad zdroj: WMS Google Satellite

Vektor vrstvy mapování biotopů dostupný z data.nature.cz


Příloha M5 - Mapa historická - monochromatické ortofoto z 50-tých let



Měřítko 1:10 000


Podklad zdroj: WMS CENIA

Příloha M6 - **Mapa historická – monochromatické ortofoto z roku 1999**




Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M7 - Mapa historická - ortofoto z roku 2003



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV


Mapa historická - ortofoto z roku 2006



Měřítko 1:10 000


Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M9 - Mapa historická - ortofoto z roku 2009



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M10 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2012**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M11 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2014**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M12 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2016**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M13 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2018**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M14 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2020**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M15 - **Mapa historická - ortofoto z roku 2022**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Příloha M16 - **Mapa - ortofoto z roku 2025**



Měřítko 1:10 000
Podklad zdroj: WMS ČÚZK - ARCHIV

Legenda k mapám:

-  Hranice ZCHÚ
-  Hranice OP
-  Hranice parcel dle KN
-  Hranice dílčích ploch
-  Hranice lesních typů
-  Hranice biotopů
-  Hranice EVL

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich v PP

PP Na Jančích, Katastrální území: Chvalčov, kód KÚ: [654892]

označení dílčí plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1A	0,1162	Sečená louka. Vlhčí část území. Luční společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (biotop T1.9), místy s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v jižní části DP po okrajích na kontaktu se společenstvy lesních pasek v ochranném pásmu se expanzivně šíří třtina křovištní.	Pravidelné jednorozhodčí ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu.	1	srpen-září	1x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
1B	0,2260	Sečená louka. Vlhčí část území. Luční společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (biotop T1.9), místy s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v jižní části DP po okrajích na kontaktu se společenstvy lesních pasek v ochranném pásmu se expanzivně šíří třtina křovištní.	Pravidelné jednorozhodčí ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu.	1	srpen-září	1x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)

označení dílečků plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
2A	0,0817	Sečená louka. Sušší část území PP. Pastvinné společenstvo pohánkové pastviny (biotop T1.3) s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1). V západní části DP degraduje bylinné patro expanze z přilehlé plochy třtina křovištní, ostružiník a kopřiva.	Pravidelné jednorozční ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu.	1	červenec	1 (2) x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranný významných rostlin a živočichů	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	Dle potřeby (min 1x za 5 let)
2B	0,1230	Sečená louka. Sušší část území PP. Pastvinné společenstvo pohánkové pastviny (biotop T1.3) s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1). V severní části DP a v jižní části DP po okrajích na kontaktu se společenstvy lesních pasek v ochranném pásmu degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Pravidelné jednorozční ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu.	1	červenec	1 (2) x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranný významných rostlin a živočichů	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	Dle potřeby (min 1x za 5 let)

označení dílečků plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
2C	0,4842	Sečená louka. Sušší část území PP. Pastviné společenstvo pohánkové pastviny (biotop T1.3) s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1).	Pravidelné jednorozhodní ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu. Až v srpnu-září sečení dvou izolovaných mikrolokalit s <i>Gladiolus imbricatus</i> v jižní části plochy.	1	červenec	1 (2) x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranářsky významných rostlin a živočichů	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
2D	0,5191	Sečená louka. Plocha je od zbývající části PP odčleněna lesní cestou. Druhově chudší louka přírodního biotopu T1.1 V jihovýchodní vlhčí části dochází k narušování drnu (zřejmě rytí divokými prasaty)	Pravidelné kosení (ruční či lehčí mechanizací) jednou nebo dvakrát za rok (dle stavu vegetace), odstranění biomasy z plochy (odvoz). Až v srpnu-září sečení izolované mikrolokality s <i>Gladiolus imbricatus</i> ve východním okraji lokality (u lesního porostu).	1	červenec (při sečení 2x ročně květen - červen a srpen - září)	1-2 x ročně
			Dosev ploch s narušeným povrchem regionální luční směsí.	(1)2	duben - květen	dle potřeby
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranářsky významných rostlin a živočichů	Stabilizovat severní hranici DP (hranice PP na kontaktu s OP) linií výsadbou stromů. 23 ks, spon 10m, střídavě třešeň ptačí/dub letní.	(1)2	(říjen-listopad) březen - duben	jednorázově (na začátku období platnosti plánu péče)

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
3	0,0293	Degradovaná vlhká (sezonně podmáčená) plocha s náletem dřevin (bříza bělokorá, buk lesní, olše lepkavá). V podrostu expanduje ostružiník.	Výřez keřového patra křovinořezem.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1x za 5 let
			Redukce stromového patra (motorovou pilou). Přednostně břízu bělokorou a buk lesní. Ponechat nadějně solitéry olše lepkavé. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1x za 10 let
		Cíl péče: Druhově pestrý biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů	Následné pravidelné jednoroční ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality, včetně odstranění drobného náletu.	1	srpen-září	1x ročně
4A	0,0997	Porostní okraj. Přesahující větve vzrostlých stromů z přiléhajících lesních porostů, přírodní biotop L5.1 - květnaté bučiny. Z podrostu se do lučních ploch prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
		Cíl péče: Druhově pestrý biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů				

označení dílečků plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
4B	0,0104	Porostní okraj. Přesahující větve vzrostlých stromů z přiléhajících lesních porostů, přírodní biotop L5.1 - květnaté bučiny. Z podrostu se do lučních ploch prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
		Cíl péče: Druhově pestrý biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů				
4C	0,0096	Porostní okraj. Přesahující větve vzrostlých stromů z přiléhajících lesních porostů, přírodní biotop L5.1 - květnaté bučiny. Z podrostu se do lučních ploch prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
		Cíl péče: Druhově pestrý biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů				
4D	0,0072	Porostní okraj. Přesahující větve vzrostlých stromů z přiléhajících lesních porostů, přírodní biotop L5.1 - květnaté bučiny. Z podrostu se do lučních ploch prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	Dle potřeby (min 1x za 5 let)
		Cíl péče: Druhově pestrý biotop s přítomností diagnostických druhů a ochránářsky významných rostlin a živočichů				

označení dílčí plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5A	0,1382	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5B	0,0594	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5C	0,0207	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5D	0,0212	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5E	0,1392	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení dílčí plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5F	0,0154	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
5G	0,0374	Doprovodná liniová dřevinná vegetace - druhově i výškově diferencovaná (stromy a keře) podél odvozní cesty. Ve stromovém patře se prosazuje dub letní, bříza bělokorá, buk lesní, javory, olše lepkavá, habr obecný, vrby, třešeň ptačí, jírovec maďal. V keřovém patře roste růže šípková, místy expanduje ostružiník. Po okrajích na kontaktu s lučními porosty degraduje bylinné patro expanze třtiny křovištní.	Udržovat hranici dřevinných porostů tak aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření v neprospěch travinných společenstev, redukce náletových dřevin (omezení zástinu), příp. odstranění přesahujících větví. Likvidace dendromasy z plochy odvozem mimo plochu, po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	dle potřeby (min 1x za 5 let)
			Redukce keřového patra (ostružiník)/ zmlazení keřů růže šípkové.	(1)2	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 5 let
			Prořezávka/ probírka stromů v hlavní úrovni (přednostně břízu bělokorou). Šetřit předrůstavé solitéry, především doupné stromy a nadějně stromy v podrostu.	1	mimo hnízdní období, tj. v září - březnu	1 x za 10 let
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami, provozně bezpečný	Sanovat provozně nebezpečné, hrozící pádem na cestu a do navazujících lučních ploch.	1	bezodklad ně	dle potřeby
6	0,0149	Skupinka vzrostlých soliterních stromů (buk lesní, dub letní).	Pro toto období platnosti plánu péče bez zásahu.	-	-	-
		Cíl péče: Stabilní porost dřevin s autochtonními dřevinami				

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
7A	0,0606	Vlhčí část území. Luční společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (biotop T1.9), místy s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1), v podrostu se do bylinného patra prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Pravidelné jednorozční ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality.	1	červenec	1 (2) x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranný významných rostlin a živočichů	Redukce semenáčků, příp. odstranění spadlých větví z navazujících lesních porostů. Po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	-	červenec	dle potřeby
7B	0,1058	Vlhčí část území. Luční společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (biotop T1.9), místy s přechody společenstva do mezofilních ovsíkových luk (T1.1), v podrostu se do bylinného patra prosazuje lesní fytocenóza a semenáčky vč. mechů.	Pravidelné jednorozční ruční kosení, likvidace biomasy z plochy odvozem z lokality.	1	červenec	1 (2) x ročně
		Cíl péče: Druhově pestrý luční biotop s přítomností diagnostických druhů a ochranný významných rostlin a živočichů	Redukce semenáčků, příp. odstranění spadlých větví z navazujících lesních porostů. Po dohodě s vlastníkem pozemku lze větve ukládat v přilehlých lesních porostech.	-	červenec	dle potřeby

označení díleční plochy	výměra (ha)*	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
8	0,2012	Lesní cesta, sezonně sjízdná - zpevněná šterkem s navazujícími odvodňovacími příkopy a travnatými pásy.	Strojové sečení přiléhajících travnatých pásů a příkopů (křovinořez, sekačka)	1	červen - září	1- 2 x ročně (dle klimatické ho vývoje)
		Cíl péče: Absence expanzivní a invazní vegetace ohrožující biodiverzitu zastoupených lučních biotopů	Instalace příčné svodnice 2x. V centrální části DP (propojení DP 7B a 1B) a v západní části (propojení západní části DP 5B a 5E)	1	mimo období rozmnožov ání obožživelní ků (červen - leden)	jednorázov ě

* výměra stanovena planimetrováním pomocí GIS nástroje, pozn.: naléhavost stupeň: 1 – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu), 3 - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).