

Záměr
na vyhlášení zvláště chráněného území
a
ochranného pásma zvláště chráněného území

ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném a účinném znění
a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb.

Přírodní rezervace

Číhanské slatě

Datum zpracování:
19. 03. 2026

1. Název zvláště chráněného území

Číhanské slatě

2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území

Přírodní rezervace (dále jen „PR“) ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“).

3. Předměty ochrany a jejich popis

3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:

- ekosystémy pramenišť, slatinišť, mokřadních luk a rašelinných lesů,
- vývěry minerálních vod a plynů,
- biotop vzácného a ohroženého druhu rozsivky *Pinnularia ferrophila*.

3.2. Popis předmětů ochrany

A. ekosystémy

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště	4	Slatinné louky blíží se as. <i>Caricetum nigrae</i> (místy přechodného charakteru k vegetaci přechodových rašelinišť R2.3) s druhy: ostřice obecná (<i>Carex nigra</i>), ostřice prosová (<i>Carex panicea</i>), ostřice zobánkatá (<i>Carex rostrata</i>), ostřice ježatá (<i>Carex echinata</i>), suchopýr úzkolistý (<i>Eriophorum angustifolium</i>), kozlík dvoudomý (<i>Valeriana dioica</i>), psineček psí (<i>Agrostis canina</i>), děhel lesní (<i>Angelica sylvestris</i>), prstnatec májový (<i>Dactylorhiza majalis</i>), vrbovka bahenní (<i>Epilobium palustre</i>), mochna nátržník (<i>Potentilla erecta</i>), zábělník bahenní (<i>Comarum palustre</i>), klamonožka bahenní (<i>Aulacomnium palustre</i>), vachta trojlistá (<i>Menyanthes trifoliata</i>), ostřice blešní (<i>Carex pulicaris</i>), ostřice skloněná (<i>Carex demissa</i>), vlasolístec vlhkomilný (<i>Tomentypnum nitens</i>), károvka hrotitá (<i>Calliergonella cuspidata</i>). Na základě předběžné analýzy fytoocenologických snímků ze starších fixovaných ploch dochází k nežádoucímu snižování pokryvnosti mechového patra.
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců	1,08	Vývěry minerálních vod a kaskády rozlivů pod nimi; vegetace as. <i>Cardamino-Montion</i> , obvykle s vysokou pokryvností mechorostů a přecházející do vegetace slatinišť. Typický je výskyt bařičky bahenní (<i>Triglochin palustre</i>) a suchopýru úzkolistého (<i>Eriophorum angustifolium</i>). Stanoviště je často v důsledku hromadění železitých sraženin a tvorby okolní slatiny vyklenuto nad okolní terén. Z pohledu ochrany PR je klíčová zejména vegetace jednobuněčných řas vázaných na železité vývěry minerálních vod. Vlajkovým druhem těchto společenstev je vzácná rozsivka <i>Pinnularia ferrophila</i> považovaná doteď za endemický taxon železitých kyselék v oblasti nejzápadnějších Čech (Tájek et al. 2017). Populace <i>Pinnularia ferrophila</i> v PR Číhanské slatě je pravděpodobně největší její známou populací vůbec.

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému
T1.5 Vlhké pcháčové louky	17	Vegetace svazu <i>Calthion palustris</i> v různých stupních zachovalosti a s rozdílnou mírou druhové rozmanitosti, místy přecházející do vegetace tužebníkových lad nebo slatinných a rašelinných luk. Před expanzí keřových vrb byla tato vegetace v území jistě plošně rozsáhlejší a ještě v první polovině 20. století (kdy byly zdejší louky pravidelně koseny) i druhově mnohem bohatší. Vegetačně nejčinnější a druhově bohatší části pcháčových luk jsou od roku 2012 mozaikovitě koseny (prostřednictvím Správy CHKO z dotačního titulu PPK). Pro nekosené plochy jsou charakteristická místa s vysokou pokryvností expanzivních dominant, zejména metlicí trsnatou (<i>Deschampsia cespitosa</i>) nebo skřípinou lesní (<i>Scirpus sylvaticus</i>), vyšší pokryvností místy dosahuje také vrbina obecná (<i>Lysimachia vulgaris</i>), děhel lesní (<i>Angelica sylvestris</i>), ostřice obecná (<i>Carex nigra</i>), pcháč zelinný (<i>Cirsium oleraceum</i>), pcháč bahenní (<i>Cirsium palustre</i>) aj. V posledních desetiletích dochází k nežádoucímu snižování pokryvnosti mechového patra. V nekosených částech dochází k degradaci, hromadění stařiny, expanzi náletů a k nežádoucímu druhovému ochuzování bylinného patra (i když pomalému). V kosených částech dochází k nežádoucí homogenizaci porostů a udržování vysoké pokryvnosti ostřic a travin na úkor entomogamních druhů.
L10.1 Rašelinné březiny	9	Samovolně vzniklý mladší porost (cca 50 let starý) s břízou bělokorou (<i>Betula pendula</i>) a břízou pýřitou (<i>Betula pubescens</i>) vzniklé na místech, kde se dříve vyskytovaly jiné (a pravděpodobně cennější, nelesní) slatinné či rašelinné biotopy. Kromě porostu jihovýchodně od Slatinné kyselky je vegetace s břízami v ostatních částech PR fragmentární bez reálné perspektivy vzniku cennějších porostů – ty by bylo vhodné přeměnit opět na nelesní typy rašelinných stanovišť – a to i s ohledem na skutečnost, že se nejedná o klimaxovou vegetaci (tou jsou s ohledem na podrůstání březin smrkovým náletem podmáčené smrčiny). Stávající rašelinná březina je v posledních 20 letech stabilní a je hodnotným biotopem. Podrůstající smrky nepřesahovaly v roce 2025 výšku 2 m a zaujímaly pokryvnost do 5 %.

B. druhy

druh	stupeň ohrožení**	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace
<i>Pinnularia ferrophila</i>	-	Rozsivka obligátně vázaná na železité vývěry minerálních vod, pro něž je deštníkovým a vlajkovým druhem. Na dně přirozených vývěrů a odtokových stružek či rozlivů pod prameny vytváří zelenavé nárosty.

*stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:

C. útvary neživé přírody

útvary	geologická charakteristika	popis útvaru
minerální pramen	Studené, slabě mineralizované železnaté hydrouhličitanovo-vápenato-hořečnato-sodné kyselky (Milota et Bartoš 2008).	Vývěry minerálních vod bez znatelného umělého jímání, s doprovodnými přírodními rozlivy a typickou vegetací cévnatých rostlin.

4. Cíl ochrany

Zachovat přírodní ráz vývěřů minerálních vod a zvětšit rozlohu navazujících mělkých rozlivů železitých vod. Zajistit podmínky pro přežití populací charakteristických druhů jednobuněčných řas, zejména pak rozsivky *Pinnularia ferrophila*. Obnovení přírodního charakteru uměle jímaných pramenů. Zajištění podmínek pro přežití vzácných slatiništních druhů rostlin a zvětšení rozlohy stanovišť, na něž jsou tyto druhy vázány – tj. nelesních mokřadů, zejména slatinišť.

A. ekosystémy

ekosystém	cíl ochrany
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště	Otevřená silně zamokřená stanoviště, druhově bohatá z pohledu cévnatých rostlin, s charakteristickými druhy cévnatých rostlin. Cílem péče o PR je zabránit dalšímu úbytku nelesních slatinných stanovišť (zejména v důsledku expanze křovin a dalších sukcesních pochodů) a ideálně rozlohu slatinišť alespoň mírně zvětšit, resp. cílenými zásahy (odstraněním náletových dřevin) na vhodných stanovištích umožnit rozvoj vegetace otevřených slatinišť. Cílem je rovněž zvětšit populace vzácných slatiništních druhů rostlin pomocí klasických managementových zásahů (kosení, vyřezávání náletů), jež by měly být v případě potřeby doplněny o další specializovaná opatření (vyhrabávání stařiny, narušování drnu, mulčování mechorosty apod.).
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců	Přírodní nebo přírodně blízký charakter vývěřů s výskytem charakteristických společenstev jednobuněčných řas (jejichž deštníkovým druhem je <i>Pinnularia ferrophila</i>) a cévnatých rostlin (nejvíce charakteristickým druhem je <i>Triglochin palustre</i>).
T1.5 Vlhké pcháčové louky	Zvýšení druhové rozmanitosti vlhkých luk, zvýšení pokrývnosti dvouděložných bylin a zvýšení potravní nabídky pro opylovače. Zároveň je však vhodné zachovat heterogenitu mikrostanovišť a stálou přítomnost kvetoucích druhů i dostatek biomasy pro vývojová stádia hmyzu (např. housenky motýlů). Klíčové je zajistit rovnováhu mezi těmito požadavky - tj. zabránit degradaci luk a zároveň zachovávat dostatek potravy pro hmyz. Nutné je také předcházet nežádoucímu hromadění stařiny a homogenizaci luk, jež by mohla být důsledkem pravidelného kosení některých typů vlhkých luk (je proto pravděpodobné, že kosení bude nuno doplnit o vyhrabávání stařiny, vypalování nebo narušování drnu). Důležitým cílem je i zvýšení rozlohy biotopu na úkor keřových vrb. Vývoj vegetace na odkácených místech lze však jen obtížně predikovat - je možné, že zde vzniknou podmínky pro vznik ještě cennějších biotopů (pramenišť a slatinišť).
L10.1 Rašelinné březiny	Zachování biotopu a zabránění další sukcese směrem k porostům s vyšším zastoupením smrku, jež by měly chudší bylinné patro, zvyšovaly by nežádoucím způsobem zástin okolních biotopů a pravděpodobně také snížily stupeň zamokření stanovišť. S ohledem k nevelké rozloze biotopu by měla být potřebná opatření brzdící sukcesi jednoduchá a nenákladná (občasný výchovný zásah spočívající v redukci smrkových náletů). Kromě redukce smrku je vhodné ponechat jádrovou část rašelinných březin samovolnému vývoji - lze předpokládat, že se časem starší stromy (příp. i mrtvé dřevo) může stát útočištěm cenných druhů z různých skupin organismů. V bezprostředním okolí Slatinné kyselky rašelinné březiny a vegetace keřových vrb expandují do vývěřů minerálních vod, jež stíní a zasypávají listovým opadem – a zde je tedy vhodné jejich částečné prosvětlení.

B. druhy

druh	cíl ochrany
<i>Pinnularia ferrophila</i>	Zachování výskytu druhu v PR, případně i vytvoření nových stanovišť, která by mohla <i>Pinnularia ferrophila</i> osídlit (revitalizace jímání pramene Brodler). Zlepšení stanovištních podmínek pro druh, zejména snížení produkce listového opadu a zpomalení zazemňování vodních biotopů.

C. útvary neživé přírody

útvár	cíl ochrany
minerální pramen	Přírodní charakter vývěřů minerálních vod umožňujících existenci charakteristických společenstev jednobuněčných řas, zejména vlájkového druhu rozsivky <i>Pinnularia ferrophila</i> . Z pohledu rozsivkové flóry je důležité zajistit dostatečnou hloubku vodního sloupce ve dvojici nejdůležitějších vývěřů, tj. Slatinné a Schottově kyselce, v nichž by nemělo docházet k nadměrnému hromadění organického materiálu (zejména listového opadu). Cílenými zásahy by na stávajících lokalitách postupně mělo dojít ke zlepšení podmínek pro růst cílových druhů řas a zároveň také ke zvětšení plochy vhodných stanovišť (prosvětlení rozlivů železitých vod v hustých vrbových křovinách, zvětšení plochy rozlivů, revitalizace jímání pramene Brodler).

5. Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou stanoveny v § 34 odst. 1 zákona.

6. Návrh bližších ochranných podmínek

V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PR bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:

- povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití,
- vyznačovat cyklistické, turistické, jezdecké cesty a naučné stezky,
- upravovat jímání a jímat minerální vody,
- provádět skládky jakýchkoliv materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, a to i přechodně,
- zřizovat příkrmovací zařízení nebo slániska a příkrmovat nebo vnadit zvěř mimo příkrmovací zařízení,
- pást skot a mulčovat travní porosty,
- povolovat a provádět zásahy, které by mohly způsobit změny vodního režimu nebo znečištění vod.

7. Ochranné pásmo

7.1. Vymezení ochranného pásma

K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy je dle § 37 odst. 1 zákona navrhováno vyhlásit ochranné pásmo.

7.2. Návrh činností a zásahů v ochranném pásmu vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody

Činnosti a zásahy vázané na souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu jsou vymezeny v § 37 odst. 2 zákona.

8. Územně správní zařazení území

8.1. Zvláště chráněné území

Kraj:	Karlovarský kraj
Okres:	Cheb
Obec s rozšířenou působností:	Mariánské Lázně
Obec s pověřeným obecním úřadem:	Mariánské Lázně
Obec:	Teplá
Katastrální území:	Číhaná u Poutnova, Babice u Poutnova

8.2. Ochranné pásmo

Kraj:	Karlovarský kraj
Okres:	Cheb
Obec s rozšířenou působností:	Mariánské Lázně
Obec s pověřeným obecním úřadem:	Mariánské Lázně
Obec:	Teplá
Katastrální území:	Babice u Poutnova, Číhaná u Poutnova

9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

9.1. Zvláště chráněné území

Katastrální území: Číhaná u Poutnova – 726656
291/2 (část)

Katastrální území: Babice u Poutnova – 726630
250 (část), 253

Podrobnosti k dotčeným parcelám jsou uvedeny v příloze č. 3.

9.2. Ochranné pásmo

Katastrální území: Číhaná u Poutnova – 726656
291/2 (část)

Katastrální území: Babice u Poutnova – 726630
281 (část)

Podrobnosti k dotčeným parcelám jsou uvedeny v příloze č. 3.

10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

10.1. Zvláště chráněné území: 6,38 ha

10.2. Ochranné pásmo: 2,47 ha

11. Odůvodnění záměru

11.1. Historie ochrany území

Území je od roku 1974 součástí CHKO Slavkovský les (II. a III. zóna). Od roku 2012 je lokalita součástí mezinárodně významných mokřadů chráněných Ramsarskou úmluvou (Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa).

11.2. Hlavní důvody zpracování záměru na vyhlášení zvláště chráněného území

Vyhlášení lokality maloplošně zvláště chráněným územím je dlouhodobým záměrem proklamovaným již v plánu péče o CHKO Slavkovský les z roku 2015. Ochrana ložiska slatiny a přírodního charakteru vývěrů minerálních vod. Zajištění dlouhodobé, koncepční a detailní péče o území.

Ochrana, zachování a zlepšení stavu pramenišť, slatinišť, mokřadních luk a rašelinných lesů a organismů na ně vázaných. Lokalita je jednou z nejzachovalejších a nejvíce reprezentativních ukázek fenoménu přírodních vývěrů minerálních pramenů na území České republiky. Význam lokality je umocněn přítomností specifické řasové flóry vázané na vývěry železitých minerálních vod a neporušenou mocnou vrstvou slatiny, v níž jsou uloženy fosilní záznamy o vývoji okolní přírody a krajiny za posledních 10 000 let.

11.3. K názvu zvláště chráněného území

Číhaná je názvem nejbližší obce, o zdejších minerálních pramenech se obvykle hovoří jako o "číhanských" (přestože se území nachází už v katastrálním území sousední obce Babice). "Slatě" odkazuje na základní předpoklad výskytu chráněných přírodních fenoménů, jímž je slatiniště.

11.4. Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území

Území nejlépe odpovídá kategorii dle § 36 odst. 1 zákona přírodní rezervace - *menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.*

11.5. K předmětům ochrany

Území je nejzachovalejším souborem přírodě blízkých vývěrů minerálních vod ve Slavkovském lese. Z pohledu charakteristických společenstev jednobuněčných řas vázaných na železité vývěry minerálních vod je území pravděpodobně nejzachovalejší lokalitou v České republice. Výjimečnost lokality spočívá také v zachovalém komplexu navazujících mokřadních biotopů. Předmět ochrany je vymezen tak, aby obsáhl přírodní hodnoty celého území.

11.6. K cíli ochrany

V důsledku dlouhodobých snah o zpřístupňování vývěřů minerálních vod veřejnosti obvykle dochází k poškozování či úplnému zániku přírodní hodnoty těchto stanovišť. Důsledkem (byť často jen drobného a povrchového) odvodňování okolí vývěřů dochází ke zničení rozlivů železitých vod a tím i k zániku podmínek pro existenci charakteristických společenstev řas. Slatiniště jsou jedním z nejohroženějších a nejrychleji degradujících stanovišť v České republice a vyžadují podrobnou a pravidelnou péči. Cíle ochrany jsou tedy navrženy v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona tak, aby bylo zajištěno zachování předmětu ochrany v příznivém stavu.

11.7. K návrhu bližších ochranných podmínek

Bližší ochranné podmínky jsou navrženy v souladu s ustanovením § 44 odst. 4 zákona tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou zcela ošetřeny základními ochrannými podmínkami a mohly by vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu přírodního prostředí.

11.8. K jednotlivým bližším ochranným podmínkám

ad a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití

Stávající druh pozemků (vodní plocha) a způsob využití (zamokřená plocha) je vyhovující a změna druhu pozemků (např. na pozemky určené k plnění funkcí lesa) by z dlouhodobého hlediska mohla vést k zániku předmětu ochrany.

ad b) vyznačovat cyklistické, turistické, jezdecké cesty a naučné stezky

Nejcennější části stanovišť se často vyskytují na velmi malých rozlohách a je proto důležité pečlivě volit trasu a způsob provedení případných přístupových cest.

ad c) upravovat jímání a jímat minerální vody

Jímání i úpravy do způsobu zachycení minerálních pramenů mohou být z pohledu ochrany cílových druhů řasových společenstev zcela fatální a vést k zániku jednoho z hlavních předmětů ochrany.

ad d) provádět skládky jakýchkoliv materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, a to i přechodně

Výskyt většiny cílových druhů organismů je omezen na velmi malé plochy a jakékoliv deponie materiálů (byť i dočasné) mohou vést k zániku populací chráněných druhů.

ad e) zřizovat příkrmovací zařízení nebo slániska a příkrmovat nebo vnadit zvěř mimo příkrmovací zařízení

Zvýšená četnost výskytu zvěře, jež je obvyklým důsledkem příkrmování zvěře, je značným potenciálním rizikem pro cílová společenstva a druhy organismů (změna druhového složení vegetace, eutrofizace, neřízená disturbance, hromadění nezkrmené hmoty i snížení estetické hodnoty území).

ad f) pást skot a mulčovat travní porosty

Pastva skotu a mulčování je nevhodným způsobem péče o cílové typy vegetace. Pravděpodobnými důsledky pastvy skotu by byla přílišná eutrofizace stanovišť a neřízená disturbance půdního povrchu (zejména plošně malých přírodních vývěřů minerálních vod

a v okolí vodního toku). Pastva skotu je nežádoucí také kvůli možné kontaminaci podzemních zdrojů minerálních vod. Pravděpodobným důsledkem mulčování by bylo snížení druhové diverzity cílových rostlinných společenstev a zánik populací cílových druhů rostlin i některých druhů živočichů.

ad g) povolovat a provádět zásahy, které by mohly způsobit změny vodního režimu nebo znečištění vod.

Většina předmětů ochrany je vázána na silné zamokření stanovišť a změny ve vodním režimu, případně znečištění vod, může zásadním způsobem vážně poškodit cílová stanoviště i druhy.

11.9. K vymezení hranice zvláště chráněného území

Plocha rezervace zahrnuje celou vegetačně hodnotnou část slatinného ložiska a všechny hlavní přírodní vývěry číhanských kyselek. Hranice rezervace využívá vedení hranic pozemků v katastrální mapě.

11.10. K vymezení ochranného pásma

Ochranné pásmo zaujímá navazující části nivy Lučního potoka a jeho bezejmenného levostranného přítoku, jež hydrologicky přímo ovlivňují území PR (PR se nachází níže po proudu od ochranného pásma). Posláním ochranného pásma je zejména ochrana vodního režimu a možnost systematické dlouhodobé péče o nelesní vegetační formace – zlepšení jejich stavu by mělo významně podpořit stabilitu cílových rostlinných i živočišných společenstev v PR.

11.11. Odůvodnění navržených činností a zásahů v ochranném pásmu vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody

–

12. Použité podklady a zdroje informací

MILOTA, J.; BARTOŠ, J. (2008). Průvodce po minerálních pramenech, II. Minerální prameny Tepelska. Mar. Lázně: ZO ČSOP Kladska. 67 s.

TÁJEK, P. (2022). Číhanské slatě – vývěry minerálních vod: inventarizační průzkum vývěrů minerálních vod v připravované přírodní rezervaci Číhanské slatě a v jejím ochranném pásmu. 39 s. Manuskript.


Přílohy

Příloha č. 1 – Orientační mapa s vyznačením zvláště chráněného území


Příloha č. 2 – Katastrální mapa se zákresem zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Příloha č. 3 – Parcelní vymezení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Příloha č. 1 – Orientační mapa s vyznačením zvláště chráněného území



Příloha č. 2 – Katastrální mapa se zákresem zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma



Příloha č. 3 – Parcelní vymezení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Zvláště chráněné území

Katastrální území: Číhaná u Poutnova – 726656

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
291/2 (část)		trvalý travní porost		11476	2503
Celkem					2503

Katastrální území: Babice u Poutnova – 726630

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
250 (část)		vodní plocha	zamokřená plocha	52889	49124
253		vodní plocha	zamokřená plocha	12049	12139
Celkem					61263

* Výměra parcel v ZCHÚ nebo jejich částí byla stanovena dle GIS a může se lišit od jiných evidencí.

Ochranné pásmo:

Katastrální území: Číhaná u Poutnova – 726656

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
291/2 (část)		trvalý travní porost		11476	8973
Celkem					8973

Katastrální území: Babice u Poutnova – 726630

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
281 (část)		vodní plocha	zamokřená plocha	47344	15692
Celkem					15692

* Výměra parcel v ZCHÚ nebo jejich částí byla stanovena dle GIS a může se lišit od jiných evidencí.